

INFORMATIEBRIEF TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN T.B.V. ONDERPROTHESE

Deze informatie is voor u van belang als u in onze praktijk binnenkort een implantologische ingreep zult ondergaan. Leest u de informatie alstublieft zorgvuldig door.

De totale behandeling bestaat uit de volgende afspraken:

- **Afspraak 1:**
 - Er worden röntgenfoto's gemaakt.
 - Er wordt een medische vragenlijst en een vragenlijst over uw huidige prothese doorgenomen.
 - Er vindt een mondonderzoek plaats.
 - Er wordt een aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar.
 - Er wordt mondelinge en schriftelijke voorlichting gegeven.
- Indien de machtiging wordt afgegeven (het kan 2-12 weken duren voordat wij antwoord van de verzekeraar krijgen), wordt er telefonisch een afspraak gemaakt voor het vervolg. U ontvangt hiervan een bevestiging tezamen met een recept voor middelen ter bevordering van de wondgenezing.

Antibiotica: (Amoxicilline) waar u **2 dagen vóór de ingreep** mee moet beginnen.
Mondspoelmiddel: (Corsodyl of Perio-Aid) voor het tweemaal daags spoelen na de ingreep, gedurende twee weken. **2 dagen vóór de ingreep** hiermee starten. U kunt hiervan tijdelijke bruine verkleuringen krijgen van tong en prothese. Daarom kunt u de prothese tijdens het spoelen beter uit de mond nemen.

- **Afspraak 2:**

De implantaten worden in de mond geplaatst. Vanaf dat moment dient u de onderprothese gedurende een periode van twee weken niet te dragen. Om dat te waarborgen wordt uw onderprothese achtergehouden.
- **Afspraak 3:**

Na 14 dagen vindt de na- controle plaats en worden de hechtingen verwijderd. Dan wordt de onderprothese tijdelijk aangepast aan de nieuwe situatie om de periode van vastgroeien te overbruggen. U mag de prothese dan overdag weer dragen.
Vanaf dat moment moeten de implantaten met een tandenborstel worden gepoetst.
- **Afspraak 4:**

Controle met overzichtsröntgenfoto. Hierna ontvangt u van ons, via Fa-med factoring, een nota voor de gehele behandeling. Deze moet u samen met de machtiging (die u voor aanvang van onze verdere behandeling zult ontvangen) insturen naar uw zorgverzekeraar.
- **6 tot 10** weken na het plaatsen van de implantaten kan er worden begonnen met het vervaardigen van een nieuwe gebitsprothese. U dient hiervoor zelf een afspraak bij uw tandarts/ tandprotheticus te maken.
- Als u in bezit bent van implantaten, is een **regelmatige controle** van de implantaten, van de mondhygiëne en de prothese van belang. U wordt door ons jaarlijks opgeroepen. Ga bij problemen met de prothese tijdig naar uw tandarts/ tandprotheticus.

- Tijdens praktijkuren kunt u ons bereiken onder nummer 030-2870560. Bij ernstige klachten **buiten de praktijkuren** kunt u contact met ons opnemen via onze pieper, telefoon: 06-65001331. Luister goed naar de opdracht die u hoort; Spreek geen boodschap in, maar toets na het verzoek van de semafoon telefoniste **uw eigen 10-cijferige telefoonnummer** in (net- en abonneenummer!) en sluit af met een 'hekje'. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

ALGEMENE INFORMATIE

Wat zijn implantaten

Een implantaat kan het beste gezien worden als een soort kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Het zijn een soort plugjes. Deze permanente vervanging dient als nieuw stevig fundament. De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht (vastgroeit). Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is acht tot veertien millimeter lang.

Wanneer worden implantaten gebruikt

Als de eigen tanden en kiezen inclusief de wortel niet meer aanwezig zijn, kan gedacht worden aan het toepassen van implantaten. Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is er voldoende kaakbot nodig. Dit kan worden nagaan door bijvoorbeeld een röntgenfoto te maken.

Wat kan er op implantaten worden gemaakt

Na het plaatsen van implantaten kan een kroon, brug of een volledige prothese op de implantaten worden gemaakt. Bij een volledige prothese wordt op de implantaten eerst een drukknop geplaatst. Hierdoor krijgt de prothese meer houvast.

Wat zijn de voordelen van een prothese op implantaten

Een gewoon kunstgebit heeft dikwijls onvoldoende houvast op de kaak. Dat is vervelend als u spreekt en eet. Het maakt u onzeker. In gezelschap kunt u erdoor in verlegenheid worden gebracht.

Een prothese op implantaten is een kunstgebit dat vastklikt. Het zit comfortabel en geeft u zekerheid en zelfvertrouwen als u praat. U kunt weer eten wat u wilt en lachen zonder hand voor uw mond.

Hoe groot is de kans van slagen

Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. Daarnaast is het succespercentage van implantaten bij niet-rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de tandartsstoel en duurt ongeveer een uur. Uw lichaam wordt afgedekt met doeken. Deze doeken zijn voor een zo optimaal mogelijke hygiëne tijdens de ingreep. U wordt plaatselijk verdoofd, zodat u van de ingreep geen pijn voelt. Mocht u tijdens de behandeling toch pijn ervaren, dan kunt u dat aan ons laten weten. Wij zullen dan extra verdoving geven. Tijdens de behandeling wordt een opening in het tandvlees gemaakt. Daarna wordt er een gaatje geboord in de kaak op de plaats waar het implantaat moet komen. Het implantaat wordt hierin geplaatst. Op het implantaat wordt een afdekschroefje aangebracht. Tenslotte wordt het tandvlees gehecht.

U kunt na de behandeling zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Toch is het aan te bevelen om dit niet te doen en te zorgen voor een chauffeur of begeleider.

Hoe verloopt de genezing

De eerste dagen zult u zwelling van het wondgebied krijgen. Ook kan er napijn optreden, waarvoor u pijnstillers kunt gebruiken. Het is belangrijk dat u de mond en ook het wondgebied goed reinigt. U kunt de wond voorzichtig borstelen met de chirurgische borstel. Het voorgeschreven spoelmiddel moet ook gebruikt worden. U gebruikt het antibioticum om de kans op infectie en nabezwaren zo klein mogelijk te houden. Na het plaatsen van de implantaten volgt een rustperiode (van ongeveer zes tot twaalf weken). In deze periode groeit het kaakbot vast aan het implantaat (osseo-integratieperiode).

Na de behandeling

Na de behandeling zal de gebitsprothese niet goed meer passen. U krijgt een controle-afspraak voor het verwijderen van de hechtingen na ongeveer twee weken, waarbij de prothese wordt aangepast. De volgende controleafspraak is na ca. vier weken. Hierna kunt u verder voor het vervaardigen van de nieuwe prothese.

Zeer belangrijk!!!

Het is tijdens de ingroeiperiode van de implantaten van het grootste belang dat deze niet worden belast. Draag in de rustperiode de onderprothese overdag zo weinig mogelijk. U mag deze 's nachts niet (meer) dragen. Net als uw eigen tanden moeten ook de implantaten waarop uw prothese is bevestigd goed worden verzorgd. Deze zorg bestaat uit uw eigen onderhoud en uit controles met professionele verzorging door de tandarts-implantoloog, mondhygiënist en tandprotheticus.

Uw eigen onderhoud

De prothese en de implantaten moeten minimaal éénmaal per dag zorgvuldig worden gereinigd. Voor het reinigen kan een hand of elektrische tandenborstel worden gebruikt. Bij de implantaten is de overgang implantaat-tandvles erg belangrijk. Hier ontwikkelt zich plaque bestaande uit mondbacteriën. Indien deze plaque niet goed wordt verwijderd, veroorzaakt dit een ontsteking van het zachte weefsel rondom de implantaten. Het gevolg is bloedend tandvles, botverlies en uiteindelijk verlies van de implantaten.